

Препарат типу **Ізіклін** (або аналоги). *Інструкція:*

Придбати в аптеці 1 упаковку, що містить 2 флакони з розчином.

**1-й флакон** о 18:00 потрібно розчинити в охолодженій воді (кип'яченій, артезіанській, крім мінеральних та газованих напоїв), щоб загальний об'єм становив 500 мл (176 мл препарату+324 мл води). Отриманий розчин необхідно вжити протягом години. Також у період 19:00-21:00 потрібно вжити 1000 мл води.

**2-й флакон** за аналогічною схемою потрібно вживати зранку в день дослідження, за 5 годин до колоноскопії. Зазвичай, ефект послаблення настає через 1 годину після прийому препарату, в середньому 3-5 разів, і наприкінці прийому розчину спостерігаються прозорі виділення світло-жовтого кольору. Безпосередньо в день дослідження, якщо дослідження назначено без наркозу, пацієнтам дозволено вживати деякі прозорі розчини, такі як: чай, кава, мінеральну, солодку воду, чистий бульйон та соки без м'якоті – в необмеженій кількості. Якщо дослідження назначено з наркозом, зранку вживати рідину та їжу – заборонено, окрім препарату та води для підготовки до колоноскопії.

**З собою необхідно мати:** протоколи попередніх інструментальних досліджень, амбулаторну картку інституту імені О.О. Шалімова.